

فازولیکس®

نفازولین ۵۰/۰۵ درصد

قبل از مصرف دارو، بروشور را به دقت مطالعه کنید.

موارد مصرف دارو:

دسته دارویی: ضد احتقان و تنگ کننده عروق بینی
شکل دارویی: قطره استریل بینی
جهت تسکین موقت احتقان و گرفتگی بینی ناشی از حساسیت‌های خفیف.
مکنیسم عملکرد فازولیکس، کاهش شدت واکنش‌های حساسیتی و رفع احتقان بینی است که در اثر تحریک گیرنده‌های آلفا و انقباض عروق بینی ایجاد می‌شود.

راهنمایی‌های عمومی:

فازولیکس برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

هشدارها:

- این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.
- مصرف فازولیکس در کودکان زیر ۱۲ سال تنها با تشخیص پزشک مجاز است.
- در صورتی که درپوش ظرف قبلا باز شده است، از مصرف آن جدا خودداری نمایید.
- حداکثر دوره مصرف فازولیکس ۷۲ ساعت است.

موارد احتیاط و منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به نفازولین یا هر یک از مواد جانبی ذکر شده در بخش مشخصات دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

- مصرف فازولیکس در مبتلایان به گلوکوم، بیماری‌های قلبی-عروقی، هایپرتانسیون، اختلالات پروستات و یا سابقه ابتلا به آن، توصیه نمی‌گردد.
- استفاده بیش از حد از فازولیکس ممکن است منجر به احتقان برگشتی شود.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- در صورت بارداری و یا تصمیم برای باردار شدن پیش از مصرف فازولیکس از پزشک یا داروساز خود مشورت بخواهید.
- مصرف فازولیکس در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

تداخلات دارویی:


در صورت استفاده از سایر داروها، حتما پزشک خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌کند، اما مقدار مصرف معمول فازولیکس ۱ یا ۲ قطره سه تا چهار بار در روز است.

نحوه صحیح مصرف دارو:

- پیش از مصرف قطره دستان خود را بشویید.
- قبل از استفاده، بینی خود را به آرامی با بازدم هوا تخلیه کنید.
- پس از باز کردن درپوش بطری، بطری را بین انگشت شست و انگشت وسط نگه داشته، سر را مطابق یکی از شکل‌های زیر متمایل کرده و به آرامی به انتهای بطری فشار وارد نمایید. سر را برای چند دقیقه در همان وضعیت نگاهدارید.



- درپوش بطری را بلافاصله پس از استفاده محکم ببندید.

در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل دارو را مصرف نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
در صورت بروز عوارض زیر یا عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را قطع و با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.
احساس تنگی نفس، درد قفسه سینه، ضربان سریع یا ناهموار قلب، گرفتگی مداوم بینی، سوزش و تحریک بینی، عطسه، سردرد، سرگیجه، وزوز گوش و اضطراب.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن چهار هفته است.

مشخصات دارو:

هر ۱ میلی‌لیتر از محلول قطره استریل بینی حاوی ۰/۵ میلی‌گرم ماده موثره نفازولین (به صورت هیدروکلراید) می‌باشد. سایر مواد جانبی شامل بنزالکونیوم کلراید، سدیم کلراید، سدیم دی هیدروژن فسفات، دی‌سدیم هیدروژن فسفات، دی‌سدیم ادتات و آب قابل تزریق (water for injection) می‌باشد.

هر جعبه حاوی ۱۰ میلی‌لیتر محلول در یک بطری ۱۰ میلی‌لیتری به همراه قطره چکان و درپوش استریل می‌باشد.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی
البرز - ایران

INOCOLON

FAZOLICS[®]

Naphazoline 0.05%

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as instructed by your doctor or pharmacist.
- If you need more information or advice, ask your pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
- If you experience any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet:

1. What FAZOLICS drops are and what they are used for
2. What you need to know before you use FAZOLICS drops
3. How to use FAZOLICS drops
4. Possible side effects
5. How to store FAZOLICS drops
6. Contents of the pack and product description

1. What FAZOLICS drops are and what they are used for

Category: Decongestant

FAZOLICS drops contain naphazoline hydrochloride which belongs to a group of medicines called decongestants. Naphazoline nasal (for the nose) is for temporary relief of nasal congestion (stuffy nose) caused by hay fever, allergies, or the common cold.

2. What you need to know before you use FAZOLICS drops

Caution

Do not use FAZOLICS if you are:

- Allergic (hypersensitive) to naphazoline

hydrochloride or to any of the other ingredients in this medicine.

Take special care with FAZOLICS drops:

- Do Ask a doctor or pharmacist if it is safe for you to take naphazoline nasal if you have other medical conditions, especially heart disease, high blood pressure, diabetes, thyroid disorders, or urination problems caused by an enlarged prostate.
- Do not give this medicine to a child younger than 12 years old without medical consultation.
- If your symptoms do not improve after 3 days of treatment, stop taking this medicine and call your doctor.

Other medicines and FAZOLICS drops:

- Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines.

Pregnancy, breast-feeding, and fertility:

- Do not use this medicine without a doctor's advice if you are pregnant or you are breast-feeding a baby.

3. How to use FAZOLICS drops

Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to use

1–2 drops per nostril every 6 hours as needed.

Instructions for use in the nose

1. Wash your hands well before use.
2. Blow your nose gently.
3. Drop the required number of drops into each nostril.
4. The aim is to get the liquid to spread over all the inside surface of the nose, including the upper surface.
5. A good position is to lie on a bed with your head hanging back over the edge. Stay like this for two minutes after putting in the drops before getting up.

This is to ensure that the liquid does not immediately run out of your nose or down the back of your throat but stays in the nasal cavity for a while.

6. Kneeling or bending forwards is an alternative, but it is harder to stay like this for two minutes after putting in the drops.

7. Replace the cap on the bottle after use.

8. Wash your hands after using the drops.

If you use more FAZOLICS drops than you should:

If you are at all concerned that you have used too much of this medicine contact your doctor or pharmacist.

FAZOLICS drops are for external use only.

If you forget to use FAZOLICS drops:

Use a single drop as soon as you remember and then go back to your regular dosing routine. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing routine. Do not use a double dose to make up for the ones missed.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody experiences them.

If you experience any of the following side effects you should tell your doctor immediately. These are symptoms of an allergic reaction. Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives, difficult breathing, or swelling of your face, lips, tongue, or throat.

FAZOLICS may cause serious side effects. Stop using naphazoline nasal and call your doctor at once if you have:

- ongoing or worsening nasal stuffiness, chest pain, fast or uneven heart rate, severe headache, buzzing in your ears, anxiety, confusion, or shortness of breath.

Common side effects of FAZOLICS may include:

- Sneezing and mild burning or stinging in your nose
- If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. How to store FAZOLICS drops

•Store FAZOLICS drops in the original container away from direct light. Store below 30 °C.

•Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.

•Throw away the bottle after 4 weeks of first opening.

6. Contents of the pack and product description

What FAZOLICS drops contain:

The active substance is naphazoline hydrochloride 0.05% w/v.

The other ingredients are benzalkonium chloride, sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate, disodium hydrogen phosphate, disodiumedetate, and water for injection.

What FAZOLICS drops look like and the contents of the pack:

FAZOLICS drop is a clear and colorless liquid supplied in a 10 mL bottle with a screw cap.

Hoodis Pars Print & Design

Product Name: Fazolics Leaflet
Edit: 02
Date: 30.11.1402
Hoodis Code: HP.33381174-0
Size: L:120 x W:140 mm



P Green C



P 186 C



Black