

نفازولین

۱/۰ درصد

قبل از مصرف دارو، بروشور را به دقت مطالعه کنید.

موارد مصرف دارو:

دسته دارویی: ضد احتقان و تنگکننده عروق چشم

شکل دارویی: قطره استریل چشمی جهت تسکین موقت احتقان و قرمزی چشم ناشی از حساسیت‌های خفیف.

مکانیسم عملکرد **نفازولین** کاهش شدت واکنش های حساسیتی و رفع احتقان چشم است که در اثر تحریک گیرنده‌های آلفا و انقباض عروق چشم ایجاد می‌شود.

راهنمای‌های عمومی:

نفازولین برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

هشدارها:

* این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.

* مصرف **نفازولین** در کودکان زیر ۱۲ سال تنها با تشخیص پزشک مجاز است.

* در صورتی که درپوش طرف قبلا باز شده است، از مصرف آن جدا خودداری نمایید.

* قبل از مصرف، لنزهای تماسی را از چشم خارج نمایید.

* حداکثر دوره مصرف **نفازولین** ۷۲ ساعت است.

موارد احتیاط و منع مصرف:

* در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به نفازولین یا هر یک از مواد جانبی ذکر شده در بخش مشخصات دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

* مصرف **نفازولین** در مبتلانی به افسردگی، گلوکوم، بیماریهای قلبی-عروقی، هایپرتانسیون، اختلالات هورمونی متابولیکی و یا سابقه ابتلا به آن، توصیه نمی‌گردد.

* در صورت استفاده از پماد چشمی یا سایر قطره‌های چشمی، حداقل باید ۵ دقیقه فاصله زمانی بین مصرف دو فرآورده در نظر گرفته شود. پمادهای چشمی باید در مرحله آخر مصرف شوند.

* این قطره حاوی بنزalkonium کلراید می‌باشد. این ماده منجر به تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شده، بنابراین پیش از مصرف قطره، لنز را خارج نموده و حداقل ۱۵ دقیقه پس از استفاده از قطره مجدداً از لنز استفاده کنید.

* به دلیل احتمال تاری دید، بلافاصله پس از مصرف قطره تا برگشتن دید کامل، از رانندگی

و کار با ماشین‌آلات بپرهیزید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

* در صورت بارداری و یا تصمیم برای بارداری شدن پیش از مصرف **نفازولین** از پزشک یا داروساز خود مشورت بخواهید.

* مصرف **نفازولین** در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها، حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌کند، اما مقدار مصرف معمول **نفازولین** ۱ یا ۲ قطره سه تا چهار بار در روز در چشم ملتهب است.

نحوه صحیح مصرف دارو:

* پیش از مصرف قطره دستان خود را بشویید.

* پس از باز کردن درپوش بطری، بطری را بین انگشت شست و انگشت وسط نگه داشته، کمی سر را به عقب متمایل کرده، با انگشت میزن، پلک چشم را پایین کشیده و به آرامی به انتهای بطری فشار وارد نمایید. (مطابق شکل).



* قطره را در حفره به وجود آمده بین پلک و چشم بریزید. نوک بطری را نزدیک چشم برده اما مراقب باشید با سطح چشم، پلک و اطراف آن برخورد نکند زیرا احتمال آلوده شدن قطره وجود دارد.

* در حالیکه به سمت پایین نگاه می‌کنید چشم را به آرامی ببندید.

* به مدت ۳ تا ۵ دقیقه به کمک انگشت شست، گوشه چشم را به آرامی فشار دهید. چشم را بسته نگهدارید و در این فرصت داروی اضافی خارج شده از چشم را با دستمال پاک کنید.

* درپوش بطری را بلافاصله پس از استفاده محکم ببندید.

* در صورت استفاده بیش از مقدار تجویز شده، چشم‌ها را با آب گرم شستشو دهید.

در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل دارو را مصرف نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر یا عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را قطع و با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

واکنش‌های آلرژیک از جمله سوزش و خارش چشم، درد در چشم، اختلال در دید، سردرد، سرگیجه، تهوع.

شرایط نگهداری دارو:

* دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت نمایید.

* دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

* حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن چهار هفته است.

مشخصات دارو:

هر ۱ میلی‌لیتر از محلول قطره استریل چشمی حاوی ۱ میلی‌گرم ماده موثره نفازولین (به صورت هیدروکلراید) می‌باشد. سایر مواد جانبی شامل بنزalkonium کلراید، سدیم کلراید، دی سدیم اداتات، سدیم تترابورات، بوریک اسید و آب قابل تزریق (water for injection) می‌باشد. هر جعبه حاوی ۱۰ میلی‌لیتر محلول در یک بطری ۱۰ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان و درپوش استریل می‌باشد.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی
البرز - ایران

INOCLON

If any of the side effects get serious or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. How to store NAPHAZOLINE drops

• Store **NAPHAZOLINE** drops in the original container away from direct light. Store below 30 °C.

• Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.

• Throw away the bottle after 4 weeks of first opening.

6. Contents of the pack and product description

What **NAPHAZOLINE** drops contain:

The active substance is naphazoline hydrochloride 0.1% w/w.

The other ingredients are benzalkonium chloride, sodium chloride, disodium edetate, sodium tetraborate, boric acid, and water for injection.

What **NAPHAZOLINE** drops look like and contents of the pack:

NAPHAZOLINE drop is a clear and colorless liquid supplied in a 10 mL bottle with a screw cap.

NAPHAZOLINE

0.1%

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

•Keep this leaflet. You may need to read it again.

•Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as instructed by your doctor or pharmacist.

•If you need more information or advice, ask your pharmacist.

•This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

•If you experience any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet

- 1.What **NAPHAZOLINE** drops are and what they are used for.
- 2.What you need to know before you use **NAPHAZOLINE** drops.
- 3.How to use **NAPHAZOLINE** drops.
- 4.Possible side effects.
- 5.How to store **NAPHAZOLINE** drops.
- 6.Contents of the pack and product description.

1.What **NAPHAZOLINE** drops are and what they are used for

Category: Decongestant

NAPHAZOLINE drops contain naphazoline hydrochloride which belongs to a group of medicines called decongestants. naphazoline acts by narrowing the blood vessels in the eye, thereby reducing redness and swelling.

2.What you need to know before you use **NAPHAZOLINE** drops

Caution

Do not use **NAPHAZOLINE if you:**

•Are allergic (hypersensitive) to

naphazoline or any other of ingredients in this medicine.

•Are wearing soft contact lenses. They should be removed whilst you are using **NAPHAZOLINE** drops.

•You have glaucoma, other eye disease or have had eye surgery.

•**NAPHAZOLINE** is not recommended in children under 12 years old.

Take special care with **NAPHAZOLINE** drops:

•Talk to your doctor or pharmacist before using this medicine if you have high blood pressure, depression, heart disease, diabetes, thyroid disorders, hardening and narrowing of blood vessels or are experiencing eye pain or changes in your eyesight.

Other medicines and **NAPHAZOLINE** drops:

•Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines, particularly if you are taking digoxin, quinidine, tricyclic antidepressants, monoamine oxidase inhibitors, or antihypertensive (high blood pressure) medication.

•If you are using other eye drops or eye ointments, leave at least 5 minutes between each medicine. Eye ointments should be administered last.

•**NAPHAZOLINE** drops contain benzalkonium chloride, which may cause eye irritation and is known to discolor soft contact lenses. Therefore, contact with such lenses should be avoided. If you wear contact lenses you should remove it prior to application and wait at least 15 minutes before putting your lenses back in.

Driving and using machines:

NAPHAZOLINE drops can cause temporary blurring of vision after application to the eye. Wait until your vision is clear before driving or operating machinery.

Pregnancy, breast-feeding, and fertility:

If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, consult your doctor or pharmacist before using this medicine.

3.How to use **NAPHAZOLINE** drops

Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has instructed you.

How much to use for adults

Gently squeeze one or two drops into each eye. Repeat as necessary. Do not use more than four times in 24 hours.

Instructions for use

If you wear soft contact lenses, they must be removed during treatment of the eyes with **NAPHAZOLINE** drops.

- 1.Before opening a new bottle of **NAPHAZOLINE** drops, please check that the safety strip on the bottom of the outer cap is unbroken.
- 2.Twist the outer cap to break the seal.
- 3.Wash your hands well before use.
- 4.Remove the outer cap. If you are putting in the drops yourself, you should use a mirror.
- 5.Tilt your head back and look up at the ceiling.
- 6.Pull the lower lid of the eye out to form a small pocket between your eyelid and your eye.
- 7.Hold the container between the thumb and middle finger of the other hand, turn the bottle upside down near to your eye, try not to touch your eye with the nozzle.
- 8.Apply enough pressure to the container to release one to two drops; or as directed by your doctor.
- 9.Blink your eye a few times.
- 10.If you think that you have missed your eye, put another drop into it.
- 11.Repeat steps 5 – 10 in the other eye; if you have been told to use **NAPHAZOLINE** drops in both eyes.
- 12.Replace the outer cap on the bottle, trying not to touch the applicator tip with

anything, including the eye or your fingers.

13.Wash your hands.

If you use more **NAPHAZOLINE** drops than you should:

If you are at all concerned that you have used too much of this medicine, contact your doctor or pharmacist.

NAPHAZOLINE drops are for external use only.

If you forget to use **NAPHAZOLINE** drops:

Use a single drop as soon as you remember, and then go back to your regular dosing routine. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing routine. Do not use a double dose to make up for the one missed.

If you stop to use **NAPHAZOLINE** drops:

You should keep using **NAPHAZOLINE** drops for as long as your doctor has instructed. Your treatment is helping your condition, even if you have not noticed a difference in how you feel. Should you need to stop your treatment, your doctor will advise you how to do this.

4.Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects; although not everybody experiences them.

Most side effects from **NAPHAZOLINE** eye drops occur in; or around; the eye. Stop using the product and seek medical help immediately if you experience: allergic reactions such as itching or rashes, pain in the eye or change in vision, stinging or irritation in the eye caused by using too many drops or using them too often.

Other side effects may include:

Eye irritation, eye pain, nausea, headache, or dizziness.