

# دکسیپانتول

دکسیپانتول ۳ درصد

قبل از مصرف دارو، بشوید رو با آب و صابون.  
مطالعه کنید.

مورد مصرف دارو:

شکل دارویی: اسپری بینی  
اسپری **دکسیپانتول** به علت خاصیت مرطوب کننده و ترمیم کننده می تواند جهت پیشگیری و درمان خشکی بینی استفاده شود. به همین منظور این اسپری در رینیت ناشی از سرماخوردگی، آلرژی، خشکی بینی پس از جراحی، قرار گرفتن در محیط های دارای هوای خشک یا سرد، و همچنین در اثر مصرف برخی داروها می تواند مصرف شود.

اسپری بینی **دکسیپانتول** حاوی نمک در غلظت ایزوتونیک، فوآسی مشابه با مخاط بینی به همراه دارد. این اسپری موجب مرطوب و سازی بینی شده و آن را به طور ملایم و طبیعی پاکسازی می کند. علاوه بر این، حاوی ماده مؤثره دکسیپانتول است که با ایجاد یک لایه نازک محافظ روی مخاط بینی، موجب تقویت و پوستتسانی آن می شود. در نتیجه این اسپری باعث تسریع در ترمیم می شود.

راه های مصرف:

**دکسیپانتول** برای بیماری های غلظت شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

هشدارها:

• مصرف **دکسیپانتول** در کودکان تنها با تشخیص پزشک مجاز است. ایمنی و اثربخشی این فرآورده در کودکان زیر ۱۲ ماه بررسی نشده است و به همین منظور مصرف آن توصیه نمی گردد.  
• از تماس نوک اسپری با مخاط بینی و سطوح دیگر خودداری کنید و در صورت تماس با آب ولرم و دستمال تمیز نمایید.

مورد احتیاط و منع مصرف:

• در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به دکسیپانتول یا هر یک از مواد جانبی ذکر شده در بخش مشخصات دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

• در صورت بارداری و یا شیردهی پیش از مصرف **دکسیپانتول** از پزشک یا داروساز خود مشورت بخواهید.

تداخلات دارویی:

• در صورت استفاده از سایر داروها، حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می کند، اما مقدار مصرف معمول **دکسیپانتول** به صورت زیر است:  
• کودکان ۲۴-۱۲ ماه ۱ پاف در هر سواخ بینی دوبار در روز.  
• کودکان ۱۲-۲ سال: ۱ پاف در هر سواخ بینی ۲-۴ بار در روز.  
• کودکان بالای ۱۲ سال و بزرگسالان: ۱ پاف در هر سواخ بینی ۲-۴ بار در روز.

نحوه صحیح مصرف دارو:

• پیش از مصرف اسپری دستان خود را بشویید.

• قبل از استفاده، بینی خود را به آرامی با بازدم هوا تخلیه کنید.  
• برای اطمینان از عملکرد صحیح، آن را دراز چشم و در هوا اسپری کنید تا بتوانید ذرات ریز را ببینید.

• پس از باز کردن دریوش اسپری، اسپری را بین انگشت اشاره و انگشت وسط نگه داشته، سر را کمی به جلو خم کنید و به آرامی نفس بکشید. سر اسپری را در سواخ بینی قرار دهید، با دست سواخ دیگر بینی را مسدود نمایید و بدون تماس با مخاط بینی اسپری را فشار دهید. نفس عمیق بکشید و از وارد شدن دارو به سواخ بینی اطمینان حاصل نمایید.



• در صورت تماس سر اسپری با مخاط بینی، سر اسپری را با دستمال تمیز پاک نمایید.  
• دریوش اسپری را بلافاصله پس از استفاده محکم ببندید.  
• استفاده بیش از یک نفر از این ظرف ممکن است باعث انتشار عفونت شود.

در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض یادآوری آن از مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل دارو را مصرف ننموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به صورت آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

• در صورت بروز عوارض زیر یا عوارض غیر از آنچه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را قطع و با پزشک، داروساز یا مراکز درمانی تماس بگیرید.  
• عطسه، سوزش، تحریک یا افزایش ترشحات بینی.

شرایط نگهداری دارو:

• دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

• دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.  
• حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن چهار هفته است.

مشخصات دارو:

• هر ۱ میلی لیتر از محلول اسپری بینی حاوی ۳۰ میلی گرم ماده مؤثره **دکسیپانتول** می باشد. سایر مواد جانبی شامل بنزالکونیوم کلراید، دی سدیم ادانتات، سدیم کلراید، دی سدیم هیدروژن فسفات آنهیدروز، دی سدیم دی هیدروژن فسفات ۲ آبه، و آب قابل تزریق (water for Injection) می باشد. هر جعبه حاوی ۱۰ میلی لیتر محلول در یک بطری ۲۰ میلی لیتری به همراه اسپری و دریوش می باشد.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی  
البرز - ایران

INOCLON

# DEXPANTHENOL

3%

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

•Keep this leaflet. You may need to read it again.

•Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as instructed by your doctor or pharmacist.

•If you need more information or advice, ask your pharmacist.

•This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

•If you experience any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

## What is in this leaflet:

- 1.What **DEXPANTHENOL** nasal sprays are and what they are used for
- 2.What you need to know before you use **DEXPANTHENOL** nasal sprays
- 3.How to use **DEXPANTHENOL** nasal sprays
- 4.Possible side effects
- 5.How to store **DEXPANTHENOL** nasal spray
- 6.Contents of the pack and product description

**1.What **DEXPANTHENOL** nasal sprays are and what they are used for**  
**DEXPANTHENOL** Nasal Sprays, due to its moisturizing and regenerative properties, can be used for the prevention and treatment of nasal dryness. Accordingly, this spray may be applied in cases of rhinitis caused by common cold or allergies, nasal dryness after surgery, exposure to dry or cold environments, as well as dryness resulting from the use of certain medications.

The spray contains salt in an isotonic concentration, meaning it has properties comparable to the nasal mucosa. This ensures moisturization of the nose and provides gentle and natural cleansing. In addition, it contains the active ingredient Dexpantenol, which forms a thin protective film over the nasal mucosa, thereby nourishing and hydrating it.

## 2.What you need to know before you use **DEXPANTHENOL** nasal sprays

### Caution

Do not use **DEXPANTHENOL** nasal sprays if:

- You are allergic (hypersensitive) to Dexpantenol or to any of the other ingredients in this medicine.
- The container is damaged.

## Take special care with **DEXPANTHENOL** nasal sprays:

- Usually safe for children above 12 months, pregnant women, and the elderly, but it is best to consult your doctor or pharmacist for infants or for long-term use.
- There is not enough information available regarding the safety and efficacy of this product in children below 12 months of age.
- Avoid contact of spray nozzle with the nasal mucosa or other surfaces. If contact occurs, clean it with lukewarm water and a clean tissue.

## Other medicines and **DEXPANTHENOL** nasal sprays:

•Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines.

## Pregnancy, breast-feeding, and fertility:

•This product is safe to use if you are pregnant or breast feeding, but not for longer than 30 days without interruption.

3.How to use **DEXPANTHENOL** nasal sprays

Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

## How much to use

Children 12-24 months: 1 spray into each nostril, twice daily.

Children 2-12 years: 1 spray into each nostril, 2-4 times daily.

Children over 12 years and adults: 1 spray into each nostril, 2-4 times daily.

## Instructions for use in the nose

- 1.Wash your hands well before use.
- 2.Gently blow your nose to clear it of mucus before using the medicine.
- 3.Remove the cap. Shake the bottle. The first time you use the pump spray each day, you may have to "prime" it. Do this by squirting it a few times into the air until a fine mist comes out.
- 4.Tilt your head forward slightly. Breathe out slowly.
- 5.Hold the pump bottle with your thumb at the bottom and your index and middle fingers on top. Insert the canister tip in your nose, aiming the tip toward the back of your head. Use a finger on your other hand to close your nostril on the side not receiving the medicine.
- 6.Squeeze the pump as you begin to breathe in slowly through your nose. Repeat these steps for the other nostril. If you're using more than one spray in each nostril, follow all these steps again.
- 7.Try not to sneeze or blow your nose just after using the spray.
- 8.When you have finished, wipe the nozzle so it is clean and then put the cap back on.

For nasal use only. Each bottle should be used by only one person, as sharing the dispenser may spread infection.

If you forget to use **DEXPANTHENOL** nasal sprays:

Use a single puff as soon as you remember and then go back to your regular dosing routine. However, if it is

almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing routine. Do not use a double dose to make up for the ones missed.

## 4.Possible side effects:

Like all medications, this drug may cause some unwanted side effects, although not everyone experiences them. Discontinue use and consult a doctor, pharmacist, or medical center if you experience any of the following or other unexpected effects:

If the inside of your nose becomes very dry or irritated

Seek emergency medical help if you have signs of an allergic reaction, such as hives, difficulty breathing, or swelling of the face, lips, tongue, or throat.

## 5.How to store **DEXPANTHENOL** nasal spray

- Store Dexpantenol nasal spray in the original container away from direct light.
- Store below 30 °C.
- Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.
- Throw away the bottle after 4 weeks of first opening.

## 6.Contents of the pack and product description

What **DEXPANTHENOL** nasal sprays contain:

The active substance is Dexpantenol 3% w/v.

The other ingredients are benzalkonium chloride, disodium edetate, sodium chloride, disodium hydrogen phosphate anhydrous, sodium dihydrogen phosphate 2H<sub>2</sub>O, and water for injection.

What **DEXPANTHENOL** nasal sprays look like and the contents of the pack:  
**DEXPANTHENOL** nasal spray is a clear and colorless liquid supplied in a 20 ml bottle with a spray cap.