

GLUC-I®

Latanoprost 0.005%

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.

- Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as instructed by your doctor or pharmacist.

- If you need more information or advice, ask your pharmacist.

- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

- If you experience any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet

1. What **GLUC-I** drops are and what they are used for

2. What you need to know before you use **GLUC-I** drops

3. How to use **GLUC-I** drops

4. Possible side effects

5. How to store **GLUC-I** drops

6. Contents of the pack and product description

1. What **GLUC-I** drops are and what they are used for

Category: Prostaglandins

GLUC-I belongs to a group of medicines called prostaglandin analogues. Latanoprost eye drops lower the pressure within your eye by increasing the natural flow of fluid from inside the eye into the blood stream. Latanoprost eye drops are used to treat open angle glaucoma and ocular hypertension.

2. What you need to know before you use **GLUC-I** drops

Caution

Do not use **GLUC-I** if you are:

- Allergic (hypersensitive) to latanoprost

or to any of the other ingredients in this medicine.

Take special care with **GLUC-I** drops:

- You should be aware that if you are using **GLUC-I** drops in your eyes your doctor may need to check your eyes frequently during your treatment.

- If you or your child are about to have or have had eye surgery (including cataract surgery).

- If you or your child suffer from eye problems (such as eye pain, irritation, inflammation, or blurred vision).

- If you or your child have severe asthma or the asthma is not well controlled.

- If you have suffered or are currently suffering from a viral infection of the eye caused by the herpes simplex virus (HSV).

Other medicines and **GLUC-I** drops:

- Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines.

- If you are using other eye drops or eye ointments, leave at least 5 minutes between each medicine. Eye ointments should be administered last.

- GLUC-I** drops contain benzalkonium chloride; benzalkonium chloride may cause eye irritation and is known to discolor soft contact lenses. Therefore, contact with such lenses should be avoided. If you wear contact lenses, you should remove them prior to application and wait at least 15 minutes before putting your lenses back in.

Driving and using machines:

GLUC-I drops can cause temporary blurring of vision after application to the eye. Wait until your vision is clear before driving or operating machines.

Pregnancy, breast-feeding, and fertility:

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before using this medicine.

3. How to use **GLUC-I** drops

Always use this medicine exactly as

described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has instructed you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to use for adults, the elderly, and children

The recommended dose for adults and children is one drop once a day in the affected eye(s). The best time to do this is in the evening.

Instructions for use

If you wear soft contact lenses, they must be removed during treatment of the eyes with **GLUC-I** drops.

1. Before opening a new bottle of **GLUC-I** drops, please check that the safety strip on the bottom of the outer cap is unbroken.

2. Twist the outer cap to break the seal.

3. Wash your hands well before use.

4. Remove the outer cap. If you are putting in the drops yourself you should use a mirror.

5. Tilt your head back and look up at the ceiling.

6. Pull the lower lid of the eye out to form a small pocket between your eyelid and your eye.

7. Hold the container between the thumb and middle finger of the other hand, turn the bottle upside down near to your eye, try not to touch your eye with the nozzle.

8. Apply enough pressure to the container to release one to two drops, or as directed by your doctor.

9. Blink your eye a few times.

10. If you think that you have missed your eye, then put another drop into it.

11. Repeat steps 5–10 in the other eye, if you have been told to use **GLUC-I** drops in both eyes.

12. Replace the outer cap on the bottle, trying not to touch the applicator tip with anything, including the eye or your fingers.

13. Wash your hands.

If you use more **GLUC-I** drops than you should:

If you are at all concerned that you have used too much of this medicine, contact your doctor or pharmacist.

GLUC-I drops are for external use only.

If you forget to use **GLUC-I** drops:

Use a single drop as soon as you remember and then go back to your regular dosing routine. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing routine. Do not use a double dose to make up for the one missed.

If you stop using **GLUC-I** drops:

You should keep using **GLUC-I** drops for as long as your doctor has instructed. Your treatment is helping your condition, even if you have not noticed a difference in how you feel. Should you need to stop your treatment, your doctor will advise you how to do this.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody experiences them.

- A gradual change in your eye color due to an increase in the amount of brown pigment in the colored part of the eye known as the iris.

- A gradual change in the eyelashes of the treated eye and the fine hairs around the treated eye.

- Redness of the eye or eye irritation.

- Irritation or disruption to the surface of the eye, eyelid inflammation, eye pain, and light sensitivity. Eyelid swelling, dryness of the eye, inflammation or irritation of the surface of the eye, blurred vision, inflammation of the colored part of the eye (uveitis), swelling of the retina, skin rash, chest pain (angina), awareness of heart rhythm (palpitations), asthma, shortness of breath, headache, dizziness, muscle pain, joint pain, nausea, vomiting.

5. How to store **GLUC-I** drops

- Store unopened bottle at 2–8 °C and protect from freezing.

- Once a bottle is opened for use, it may be stored at room temperature up to 25 °C.
- Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.

- Throw away the bottle after 4 weeks of

گلوک-آی®

لاتانوپروست ۰۵۰/۵ درص

قبل از مصرف دارو، بروشور را به دقت مطالعه کنید.

موارد مصرف دارو:

دسته دارویی: آنالوگ پروستاگلندین
شکل دارویی: قطره استریل چشمی
جهت درمان و کاهش فشار داخلی چشم (IOP) در بیماران مبتلا به گلوکوم با زاویه باز و هایپرتانسیون چشمی.

مکانیسم عملکرد: گلوک-آی کاهش فشار داخلی چشم است که در اثر افزایش خروج مایع زلالیه از چشم ایجاد می شود.

راههای مصرف عمومی:

گلوک-آی برای بیماری عصبی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

هشدارها:

- این دارو فقط به نسخه پزشک قابل تهیه است.
- در صورتی که درپوش ظرف قبلا باز شده است، از مصرف آن جدا خودداری نمایید.
- قبل از مصرف، لنزهای مشتمل دارو با پزشک خارج نمایید.
- برای کنترل فشار داخلی چشم و انجام معاینات منظم به پزشک مراجعه کنید.

موارد احتیاط و منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به لاتانوپروست و یا هر یک از مواد جانیی ذکرشده در بخش مشخصات دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
- مصرف گلوک-آی در مبتلایان به آسم، بیماریهای عصبی و ویروسی چشم، اختلالات بینایی (در، سوزش، التهاب) و یا سابقه ابتلا به آن، توصیه نمی گردد.
- در صورت استفاده از پماد چشمی یا سایر قطره های چشمی، حداقل باید ۵ دقیقه فاصله زمانی بین مصرف دو فرآورده در نظر گرفته شود. پاددهای چشمی باید در مرحله آخر مصرف شوند.
- این قطره حاوی بنزالکونیوم کاربید می باشد. این ماده منجر به تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شده، بنابراین پیش از مصرف قطره، لنز را خارج نموده و حداقل ۵ دقیقه پس از استفاده از قطره مجدداً لنز استفاده کنید.
- مصرف قطره تا برگشتن دید کامل، از رانندگی و کار با ماشین آلات پرهیز کنید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- در صورت بارداری و یا تصمیم برای بارداری شدنی پیش از مصرف گلوک-آی از پزشک یا داروساز خود مشورت بخواهید.
- مصرف گلوک-آی در دوران شیردهی توصیه نمی گردد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها، حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می کند. اما مقدار مصرف معمول گلوک-آی یک قطره در چشم، یک بار در روز (عصر) است.

نحوه صحیح مصرف دارو:

پیش از مصرف قطره دستان خود را بشوید. سپس از باز کردن درپوش بطری، بطری را بین انگشت شست و انگشت وسط نگه داشته، کمی سر را به عقب متمایل کرده، با انگشت تعجب، یک قطره را پایین کشیده و به آرامی به انتهای بطنی فشار وارد نمایید. (مطابق شکل).



- قطره را در حفره به وجود آمده بین پلک و چشم بریزید. نوک بطری را نزدیک چشم برده اما مراقب باشید با سطح چشم، پلک و اطراف آن برخورد نکند زیرا احتمال آلوده شدن قطره وجود دارد.

- در حالیکه به سمت پایین نگاه می کنید چشم را به آرامی ببندید.
- به مدت ۳ تا ۵ دقیقه به کمک انگشت شست، چشم را به آرامی فشار دهید. چشم را بسته نگه دارید و در این فرصت داروی اضافی خارج شده از چشم را با دستمال پاک کنید.
- درپوش بطری را بلافاصله پس از استفاده محکم ببندید.

- در صورت استفاده بیش از مقدار تجویز شده، چشمها را با آب گرم شستشو دهید.
- در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل دارو را مصرف ننموده و مقدار آن را دو برابر نکنید. در صورت بروز علائم بیهوشی مصرف دارو را متوقف نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض از یک فرد دیده نمی شود.

در صورت بروز عوارض زیر یا عوارضی غیر از

آنچه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را قطع و با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

واکنش های آلرژیک از جمله تنگی نفس، التهاب ملتحمه، سوزش و قرمزی چشم، شعله عصبانی، تورم، سردرد، سرگیجه، تهوع، استفراغ و تغییر رنگ عنبیه.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را در یخچال و در دمای بین ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری کنید و از یزدگی محافظت نمایید.

پس از باز نمودن درپوش ظرف، دارو را در دمای اتاق (حداکثر ۵ درجه سانتیگراد) نگهداری نمایید.

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن چهار هفته است.

مشخصات دارو:

هر ۱ میلیلیتر از محلول قطره استریل چشمی حاوی ۰/۵٪ میلی گرم ماده موثره لاتانوپروست می باشد. سایر مواد جانی شامل بنزالکونیوم، کلراید، سدیم کلراید، سدیم هیدروکسید، سدیم فسفات دی بازیک، سدیم فسفات مونو بازیک و آب قابل تزریق (water for injection) می باشد. هر جبهه حاوی ۵ میلیلیتر محلول و یک بطری ۵ میلیلیتری به همراه قطره حفره درپوش استریل می باشد.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی
البرز - ایران

INCLON

first opening.

6.Contents of the pack and product description

What GLUCIA drops contain:

The active substance is latanoprost 0.005% w/v.

The other ingredients are benzalkonium chloride, sodium chloride, sodium hydroxide, sodium phosphate dibasic, sodium phosphate monobasic and water for injection.

What GLUCIA drops look like and the contents of the pack:

GLUCIA drop is a clear and colorless liquid supplied in a 5 mL bottle with a screw cap.