

تیکوف-آی®

کتوتیفن ۲۵/۰/۵ درم

قبل از مصرف دارو، بروشور را به دقت مطالعه کنید.

موارد مصرف دارو:

دسته دارویی: آنتی‌هیستامین
شکل دارویی: قطره استریل چشمی
جهت کنترل و درمان علامتی التهاب و قرمزی چشم ناشی از حساسیت‌های فصلی.
مکانیسم عملکرد **تیکوف-آی**: کاهش شدت واکنش‌های حساسیتی است که در اثر مهار آزادسازی هیستامین از ماست‌سل‌ها و با مهار غیر انتخابی گیرنده‌های هیستامین H1 ایجاد می‌شود که از آن جمله می‌توان خارش، قرمزی و تورم در سطح چشم را نام برد.

راهنمایی‌های عمومی:

تیکوف-آی برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

هشدارها:

- این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.
- مصرف **تیکوف-آی** در کودکان زیر ۳ سال تنها با تشخیص پزشک مجاز است.
- در صورتی که درپوش ظرف قبلا باز شده است، از مصرف آن جدا خودداری نمایید.
- قبل از مصرف، لنزهای تماسی را از چشم خارج نمایید.

موارد احتیاط و منع مصرف:

- در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به کتوتیفن یا هر یک از مواد جانبی ذکر شده در بخش مشخصات دارو یا پزشک خود مشورت نمایید.
- در صورت استفاده از پماد چشمی یا سایر قطره‌های چشمی، حداقل باید ۵ دقیقه فاصله زمانی بین مصرف دو فرآورده در نظر گرفته شود. پمادهای چشمی باید در مرحله آخر مصرف شوند.
- این قطره حاوی بنزالکونیوم کلراید می‌باشد. این ماده منجر به تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شده، بنابراین پیش از مصرف قطره، لنز را خارج نموده و حداقل ۱۵ دقیقه پس از استفاده از قطره مجدداً از لنز استفاده کنید.
- به دلیل احتمال تاری دید، بلافاصله پس از مصرف قطره تا برگشتن دید کامل، از رانندگی و کار با ماشین‌آلات بپرهیزید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

- در صورت بارداری و یا تصمیم برای بارداری شدن پیش از مصرف **تیکوف-آی** از پزشک یا داروساز خود مشورت بخواهید.
- مصرف **تیکوف-آی** در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

تداخلات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها، حتماً پزشک خود را مطلع کنید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌کند، اما مقدار مصرف معمول **تیکوف-آی** یک قطره در چشم ملتهب دوبار در روز (صبح و شب) است.

نحوه صحیح مصرف دارو:

- پیش از مصرف قطره دستان خود را بشویید.
- پس از باز کردن درپوش بطری، بطری را بین انگشت شست و انگشت وسط نگه داشته، کمی سر را به عقب متمایل کرده، با انگشت تمیز، پلک چشم را پایین کشیده و به آرامی به انتهای بطری فشار وارد نمایید. (مطابق شکل).



- قطره را در حفره به وجود آمده بین پلک و چشم بریزید. نوک بطری را نزدیک چشم برده اما مراقب باشید با سطح چشم، پلک و اطراف آن برخورد نکند زیرا احتمال آلوده شدن قطره وجود دارد.

- در حالیکه به سمت پایین نگاه می‌کنید چشم را به آرامی ببندید.
- به مدت ۳ تا ۵ دقیقه به کمک انگشت شست، گوشه چشم را به آرامی فشار دهید. چشم را بسته نگاهدارید و در این فرصت داروی اضافی خارج شده از چشم را با دستمال پاک کنید.
- درپوش بطری را بلافاصله پس از استفاده محکم ببندید.
- در صورت استفاده بیش از مقدار تجویز شده، چشم‌ها را با آب گرم شستشو دهید.
- در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل دارو را مصرف نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده

نمی‌شود.

در صورت بروز عوارض زیر یا عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را قطع و با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.

واکنشهای آلرژیک از جمله راش پوستی، التهاب ملتحمه، سوزش، خارش، قرمزی، آبریزش و خشکی چشم، تورم و به ندرت درد چشم، اختلال در دید، حساسیت به نور، سردرد، خواب‌آلودگی.

شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت نمایید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن چهار هفته است.

مشخصات دارو:

هر ۱ میلی‌لیتر از محلول قطره استریل چشمی حاوی ۰/۲۵ میلی‌گرم ماده مؤثره کتوتیفن (به صورت فومارات) می‌باشد. سایر مواد جانبی شامل بنزالکونیوم کلراید، سدیم هیدروکسید، گلیسرین و آب قابل تزریقی (water for injection) می‌باشد. هر جعبه حاوی ۵ میلی‌لیتر محلول در یک بطری ۵ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان و درپوش استریل می‌باشد.

rash), dry mouth, allergic reaction (including swelling of the face and eyelids), and increase in severity of existing allergic conditions, such as asthma and eczema.

• If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

5. How to store TIKOF-I Drops

- Store **TIKOF-I** Drops in the original container away from direct light. Store below 30 °C.
- Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.
- Throw away the bottle after 4 weeks of first opening.

6. Contents of the pack and product description

What **TIKOF-I** Drops contain:

The active substance is Ketotifen fumarate 0.025% w/w. The other ingredients are benzalkonium chloride, sodium hydroxide, glycerin and water for injection.

What **TIKOF-I** Drops looks like and contents of the pack:

TIKOF-I Drops is a clear and colorless liquid supplied in a pack of 5 mL bottle with screw caps.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی
البرز - ایران

INOCLON

TIKOF-I[®]

Ketotifen 0.025%

stabilizer that prevents allergic reactions by reducing the release of natural substances that cause allergic reactions.

2. What you need to know before you use TIKOF-I Drops

Caution

Do not use TIKOF-I if you are:

• Allergic to Ketotifen or any of the other ingredients of this medicine

Other medicines and TIKOF-I Drops:

• Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

• If you are using other eye drops or eye ointments, leave at least 5 minutes between each medicine. Eye ointments should be administered last.

• TIKOF-I Drops contains Benzalkonium chloride; Benzalkonium chloride may cause eye irritation and is known to discolor soft contact lenses, therefore, contact with such lenses should be avoided. If you wear contact lens you should remove it prior to application and wait at least 15 minutes before putting your lenses back in.

Driving and using machines:

TIKOF-I Drops can cause temporary blurring of vision after application to the eye. Wait until your vision is clear whilst driving or using machines.

Pregnancy, breast-feeding and fertility:

• If you are pregnant, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist advice before using this medicine.

• You should not use TIKOF-I Drops if you are breastfeeding.

3. How to use TIKOF-I Drops

Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to use for adults, the elderly and children

Do not use TIKOF-I in children under the age of 3 years.

It is better to check with your doctor or pharmacist. However, the recommended dose is one drop in each eye; twice a day in the morning and evening.

Instructions for use

If you wear soft contact lenses these must be removed during treatment of the eyes with TIKOF-I Drops.

1. Before opening a new bottle of TIKOF-I Drops, please check that the safety strip on the bottom of the outer cap is unbroken.

2. Twist the outer cap to break the seal.

3. Wash your hands well before use.

4. Remove the outer cap. If you are putting in the drops yourself you should use a mirror.

5. Tilt your head back and look up at the ceiling.

6. Pull the lower lid of the eye out to form a small pocket between your eyelid and your eye.

7. Hold the container between the thumb and middle finger of the other hand, turn the bottle upside down near to your eye, try not to touch your eye with the nozzle.

8. Apply enough pressure to the

container to release one to two drops, or as directed by your doctor.

9. Blink your eye a few times.

10. If you think that you have missed your eye, then insert another drop.

11. Repeat steps 5-10 in the other eye, if you have been told to use TIKOF-I Drops in both eyes.

12. Replace the outer cap on the bottle, trying not to touch the applicator tip with anything, including the eye or your fingers.

13. Wash your hands.

If you use more TIKOF-I Drops than you should:

If you are at all concerned that you have used too much of this medicine contact your doctor or pharmacist.

TIKOF-I Drops are for external use only.

If you forget to use TIKOF-I Drops:

Use a single drop as soon as you remember and then go back to your regular dosing routine. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose before going back to your regular dosing routine. Do not use a double dose to make up for the one missed.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

• Eye irritation or pain and inflammation in the eye.

• Blurred vision when putting drops on the eye, dry eye, eyelid disorder, conjunctivitis, increased sensitivity of the eyes to light, visible bleeding in the white of the eye, headache, drowsiness, rash (which may also itch), eczema (itchy, red, burning

What is in this leaflet:

1. What TIKOF-I Drops are and what they are used for.

2. What you need to know before you use TIKOF-I Drops.

3. How to use TIKOF-I Drops.

4. Possible side effects.

5. How to store TIKOF-I Drops.

6. Contents of the pack and product description.

1. What TIKOF-I Drops are and what they are used for

Category: Antihistamine

TIKOF-I is an antihistamine for the eye that treats allergic symptoms by blocking a certain natural substance (histamine). It is also a mast cell