

افلوکساستین

۳/۳ د حرمه

قبل از مصرف دارو، پروبوسور را به دقت مطالعه کنید.

موارد مصرف دارو:

دسته دارویی: آنتی‌بیوتیک، فلوروکینولون‌ها
شکل دارویی: قطره استریل چشمی
جهت درمان زخم قرنیه و عفونت‌های باکتریال ناشی از ارگانسیم‌های حساس.
مکانیسم عملکرد: افلوکساستین مهار همانندسازی DNA در سلول‌های باکتریایی است.

راهنمای های عمومی:

افلوکساستین برای بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه با توصیه به دیگران جدا خودداری نمایید.

هشدارها:

این دارو فقط با نسخه پزشک قابل تهیه است.
در صورتی که دریوش ظرف قبلا باز شده است، از مصرف آن جدا خودداری نمایید.
قبل از مصرف، لنزهای تماسی را از چشم خارج نمایید.
مصرف طولانی مدت **افلوکساستین** سبب بروز عفونت‌های ثانویه خواهد شد.

موارد احتیاط و منع مصرف:

در صورت وجود هرگونه حساسیت نسبت به افلوکساستین یا هر یک از مواد جانبی ذکر شده در بخش مشخصات دارو با پزشک خود مشورت نمایید.
مصرف **افلوکساستین** در بیماران که نسبت به سایر کیتولون‌ها حساسیت دارند، منع مصرف دارد.
در صورت استفاده از پماد چشمی یا سایر قطره‌های چشمی، حداقل باید ۵ دقیقه فاصله زمانی بین مصرف دو فرآورده در نظر گرفته شود. پمادهای چشمی باید در مرحله آخر مصرف شوند.

این قطره حاوی بنزالکونیوم کلراید می‌باشد. این ماده منجر به تغییر رنگ لنزهای تماسی نرم شده، بنابراین پیش از مصرف قطره، لنز را خارج نموده و حداقل ۱۵ دقیقه پس از استفاده از قطره مجدداً از لنز استفاده کنید.
به دلیل احتمال تاری دید، بلافاصله پس از مصرف قطره تا برگشتن دید کامل، از رانندگی و کار با ماشین آتات بپرهیزید.

مصرف در بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری و یا تصمیم برای باردار شدن پیش از مصرف **افلوکساستین** از پزشک یا داروساز خود مشورت بخواهید.
مصرف **افلوکساستین** در دوران شیردهی توصیه نمی‌گردد.

تحذیحات دارویی:

در صورت استفاده از سایر داروها، حتماً پزشک خود را مطلع نمایید.

مقدار مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک معین می‌کند، اما مقدار مصرف معمول **افلوکساستین** به شرح زیر است.
روز اول و دوم هر ۴ تا ۴ ساعت یک تا دو قطره، سپس برای ۵ روز دیگر، هر ۶ ساعت یک تا دو قطره در چشم مبتلا بچکانند.

نحوه صحیح مصرف دارو:

پیش از مصرف قطره دستان خود را بشویید.
پس از باز کردن دریوش بطری، بطری را بین انگشت شست و انگشت وسط نگه داشته، کمی سر را به عقب متمایل کرده، با انگشت تعزیز، پلک چشم را پایین کشیده و به آرامی به انتهای بطری فشار وارد نمایید. (مطابق شکل).



قطره را در حفره به وجود آمده بین پلک و چشم بریزید. نوک بطری را نزدیک چشم برده اما مراقب باشید با سطح چشم، پلک و اطراف آن برخورد نکند زیرا احتمال آلوده شدن قطره وجود دارد.

در حالی‌که به سمت پایین نگاه می‌کنید چشم را به آرامی ببندید.
به مدت ۳ تا ۵ دقیقه به کمک انگشت شست، گوشه چشم را به آرامی فشار دهید. چشم را بسته نگذارید و در این فرصت داروی اضافی خارج شده از چشم را با دستمال پاک کنید.

دریوش بطری را بلافاصله پس از استفاده محکم ببندید.
در صورت استفاده بیش از مقدار تجویز شده، چشم‌ها را با یک گرم شستشو دهید.
در صورت فراموشی هر نوبت از دارو، به محض یادآوری آن را مصرف کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت بعدی فرا رسیده بود، مطابق روال قبل دارو را مصرف نموده و مقدار آن را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات آثار درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود.
در صورت بروز عوارض زیر یا عوارضی غیر از آنچه در برگه راهنما قید گردیده است دارو را قطع و با پزشک، داروساز و یا مراکز درمانی تماس بگیرید.
عفونت ثانویه چشم، سوزش، خارش، قرمزی و آبریزش چشم، تورم و به ندرت درد در چشم، اختلال در دید، حساسیت به نور و احساس مزه بد در دهان.

هشدار نگهداری:

دارو را دور از نور و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از بی‌خردگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
حداکثر زمان نگهداری دارو پس از باز شدن چهار هفته است.

مشخصات دارو:

هر ۱ میلی‌لیتر از محلول قطره استرین چشمی حاوی ۳ میلی‌گرم ماده موثره افلوکساستین می‌باشد. سایر مواد جانبی شامل بنزالکونیوم کلراید، سدیم کلراید و آب قابل تزریق می‌باشد. هر جبهه حاوی ۵ میلی‌لیتر محلول در یک بطری ۵ میلی‌لیتری به همراه قطره‌چکان و دریوش استرین می‌باشد.



ساخت شرکت داروسازی نوآوری زیستی
البرز - ایران

OFLOXACIN

0.3 %

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist told you.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

What is in this leaflet:

- 1.What **OFLOXACIN** Drops are and what they are used for.
- 2.What you need to know before you use **OFLOXACIN** Drops.
- 3.How to use **OFLOXACIN** Drops.
- 4.Possible side effects.
- 5.How to store **OFLOXACIN** Drops.
- 6.Contents of the pack and product description.

1.What **OFLOXACIN** Drops are and what they are used for

Category: Antibiotic, Fluoroquinolone
OFLOXACIN Drops contain ofloxacin, which belongs to a group of medicines called fluoroquinolone antibiotics. These are used to treat bacterial

infections by inhibiting DNA replication in bacterial cells.**OFLOXACIN** Drops are used for the treatment of corneal ulcers and bacterial infections of the eye caused by susceptible organisms.

2.What you need to know before you use **OFLOXACIN** Drops

Caution

Do not use **OFLOXACIN** if:

- You are allergic (hypersensitive) to ofloxacin or to any of the other ingredients of this medicine.
- You are allergic (hypersensitive) to other quinolones.

Take special care with **OFLOXACIN** Drops:

- Prolonged use may result in fungal or bacterial superinfection.

Other medicines and **OFLOXACIN** Drops:

- Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines.
- If you are using other eye drops or eye ointments, leave at least 5 minutes between each medicine. Eye ointments should be administered last.
- OFLOXACIN** Drops contain benzalkonium chloride. Benzalkonium chloride may cause eye irritation and is known to discolor soft contact lenses; therefore, contact with such lenses should be avoided. If you wear contact lenses, you should remove them prior to application and wait at least 15 minutes before putting your lenses back in.

Driving and using machines:

OFLOXACIN Drops can cause temporary blurring of vision after application to the eye. Wait until your vision is clear whilst driving or using machines.

Pregnancy, breast-feeding, and fertility:

- If you are pregnant, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist advice before using this medicine.
- You should not use **OFLOXACIN** Drops if you are breastfeeding.

3.How to use **OFLOXACIN** Drops

Always use this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

How much to use

Instill 1 to 2 drops in affected eye(s) every 2 to 4 hours for the first 2 days, then instill 1 to 2 drops 4 times daily for an additional 5 days.

Instructions for use

Instructions for use in the eye:

If you wear soft contact lenses these must be removed during treatment of the eyes with **OFLOXACIN** Drops.

- 1.Before opening a new bottle of **OFLOXACIN** Drops, please check that the safety strip on the bottom of the outer cap is unbroken.
- 2.Twist the outer cap to break the seal.
- 3.Wash your hands well before use.
- 4.Remove the outer cap. If you are putting in the drops yourself, you should use a mirror.
- 5.Tilt your head back and look up at the ceiling.
- 6.Pull the lower lid of the eye out to form a small pocket between your eyelid and your eye.
- 7.Hold the container between the thumb and middle finger of the other

hand, turn the bottle upside down near to your eye, try not to touch your eye with the nozzle.

- 8.Apply enough pressure to the container to release one to two drops, or as directed by your doctor.
- 9.Blink your eye a few times.
- 10.If you think that you have missed your eye, then insert another drop.
- 11.Repeat steps 5-10 in the other eye, if you have been told to use **OFLOXACIN** Drops in both eyes.
- 12.Replace the outer cap on the bottle, trying not to touch the applicator tip with anything, including the eye or your fingers.
- 13.Wash your hands.

If you use more **OFLOXACIN** Drops than you should:

If you are at all concerned that you have used too much of this medicine, contact your doctor or pharmacist.

OFLOXACIN Drops are for external use only.

If you forget to use **OFLOXACIN** Drops:

Use a single drop as soon as you remember and then go back to your regular dosing routine. However, if it is almost time for your next dose, skip the missed dose and go back to your regular dosing routine. Do not use a double dose to make up for the one missed.

If you stop using **OFLOXACIN** Drops:

You should keep using **OFLOXACIN** Drops for as long as your doctor has instructed. Your treatment is helping your condition, even if you have not noticed a difference in how you feel. Should you need to stop your treatment, your doctor will advise you how to do this.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

If you experience any of the following side effects, you should tell your doctor immediately.

Secondary eye infection, burning, itching, redness and tearing of the eye, swelling, and rarely eye pain, visual disturbance, sensitivity to light, and a bad taste in the mouth.

5. How to store OFLOXACIN Drops

- Store OFLOXACIN Drops in the original container away from direct light. Store below 30°C.

- Keep this medicine in a safe place where children cannot see or reach it.

- Throw away the bottle after 4 weeks of first opening.

6. Contents of the pack and product description

What OFLOXACIN Drops contain:

The active substance is ofloxacin 0.3% w/v.

The other ingredients are benzalkonium chloride, sodium chloride, and water for injection.

What OFLOXACIN Drops look like and the contents of the pack:

OFLOXACIN Drops is a clear and colorless liquid supplied in a pack of 5 mL bottle with a screw cap.